

## Matériel

### 1. CONTENTION DES PORCELETS :

= nécessaire pour l'application de l'anesthésie locale.

**Manuellement** ou en utilisant un dispositif spécifique de contention de type "**appareil à castrer**".

(Avantage "appareil à castrer" : permet à l'opérateur de travailler de façon plus précise, à la bonne hauteur et avec le dos droit.)

### 2. AIGUILLES :

- a. Analgésie : **dans les muscles – 21 G (0,8x9mm)**  
(métal détectable)
- b. Anesthésie locale : **dans le testicule – 25 G (0,5x16mm)<sup>1</sup>**  
(non détectable par le métal)

### 3. SERINGUES :

Utiliser des **seringues adaptées** aux volumes à injecter pour **administrer de façon précise les quantités de produits nécessaires**.

- Petits volumes : e.g. **dose 0,5 cc = seringue de 0,5 - 1 cc**
- Graduées : **échelle de 0,1 ml**

### 4. LAMES :

Utiliser des lames **bien aiguisées** !

- **1 lame/portée<sup>2</sup>**
- **Utiliser alternativement deux lames**, l'une trempant dans **une solution antiseptique** pendant que la seconde est utilisée
- Conserver **les lames** dans un **réceptacle hermétique**

### 5. GANTS :

**Eviter le contact avec la peau !** Utilisez de gants de type **chirurgical** (nitrile)

### 6. CAISSE :

- Assez **haute** (40 cm minimum)
- Suffisamment **grande** (les porcelets puissent se coucher côte à côte)
- **Propre et sèche**

<sup>1</sup> Préférable, si non 21G.

<sup>2</sup> Max. 1 lame/2 portées.



Ces fiches synthèses ont été rédigées dans le cadre de la castration des porcelets sous anesthésie locale avec analgésie.

– [www.belpork.be](http://www.belpork.be) –