





Médicaments

MÉDICAMENTS

- a. Analgésie :
- Meloxicam: p.e. Emdocam, Meloxidolor, Melovem, Metacam
 - Ketoprofen: p.e. Rifen
- b. Anesthésie locale :
- Pronestestic (40mg/ml)
 - Procaine hydrochloride 4% adrenaline
 - Procaine hydrochloride 4%
 - Procainii chloridum 4% + adrenalinum

MÉDICAMENT	POSOLOGIE	TEMPS D'ATTENDRE	DÉLAI D'ATTENTE	CONSERVATION
 PRONESTESIC	Max. 0,5 ml par testicule	Min. 5 min., max. 45 min.	0 jours	Durée de conservation après ouverture : 28 jours Conserver à température ambiante (< 25°C)
 PROCAINE HYDROCHLORIDE 4% ADRENALINE	Max. 0,5 ml par testicule	Min. 5 min., max. 90 min.	0 jours	Utiliser immédiatement après ouverture Conserver à 2-8°C (réfrigérateur) + protéger de la lumière
 PROCAINE HYDROCHLORIDE 4%	Max. 0,5 ml par testicule	Min. 5min., max. 30 min.	0 jours	Utiliser immédiatement après ouverture Conserver à 2-8°C (réfrigérateur) + protéger de la lumière
 PROCAINII CHLORIDUM 4% + ADRENALINUM	Max. 0,5 ml par testicule	min. 5 min., max. 30 min.	3 jours	Durée de conservation après ouverture : 28 jours Conserver à 2-8°C (réfrigérateur) + protéger de la lumière

– L'anesthésie locale avec adrénaline est préférable –

Médicaments anesthésiques :

- Uniquement mis à disposition par le vétérinaire d'exploitation (A&F document!)
- Uniquement sous réserve d'un accord écrit
- Uniquement la quantité nécessaire à la castration des porcelets.
- Doit être renseigné dans le registre de l'élevage
- Anesthésiques dans la réserve du responsable = INTERDITE !

Ces fiches synthèses ont été rédigées dans le cadre de la castration des porcelets sous anesthésie locale avec analgésie.

– www.belpork.be –