

Technique

1. CASTRER UNIQUEMENT DES ANIMAUX EN BONNE SANTÉ

2. HYGIÈNE

- La zone opératoire est sèche et débarrassée de toute saleté !
- Désinfecter la peau éventuellement (p.e. : iode)
- Lames et aiguilles
 - Changer après chaque portée
 - Utiliser alternativement deux scalpels (ou pinces) : l'un trempant dans une solution antiseptique.



3. LE PORCELET DOIT RESTER COUCHÉ


Fixez le porcelet et le testicule.

4. ADMINISTREZ L'ANALGÉSIQUE

5. INJECTEZ L'ANESTHÉSIQUE

Injecter en tirant l'aiguille vers l'arrière.


- Max. 0,5 ml par testicule
- Une goutte sur la peau (anesthésier la peau)



6. ATTENDEZ AU MINIMUM 5 MIN. ET AU MAXIMUM 30 MIN.

7. FAIRE UNE INCISION

- Une incision verticale en regard de chaque testicule
- Incision de taille suffisante : extraction des testicules souple, éviter les intestins bombés



8. LIMITEZ LA TRACTION SUR LE CORDON TESTICULAIRE !

La traction est douloureuse et augmente le risque de gonflement de l'intestin.

9. COUPEZ LE CORDON SPERMATIQUE !

Le déchirement des tissus est interdit !



AR 19 avril 2023

La castration chirurgicale des porcelets par le responsable :

- Uniquement des porcelet âgés de max. 7 jours
- Seule avec anesthésie locale et analgésie
- Sous la supervision directe de vétérinaire d'exploitation
- Sous réserve d'un accord écrit avec le vétérinaire d'exploitation

Ces fiches synthèses ont été rédigées dans le cadre de la castration des porcelets sous anesthésie locale avec analgésie.

– www.belpork.be –