

D'ORGANISATION DU TRAVAIL

Organiser l'anesthésie locale et la castration en fonction des autres routines de manière à ce que le temps soit utilisé efficacement et que le temps d'attente de min. 5min et max. 30-45min entre l'anesthésie et la castration soit respecté. Trouvez l'organisation de travail qui vous convient le mieux. Quelques possibilités :

A. UNE PORTÉE À LA FOIS

1. Anesthésie locale et analgésie de tous les porcelets mâles.
2. Les autres routines sont effectuées
3. Castration des porcelets mâles (au moins 5 min. après l'anesthésie !)

B. PLUSIEURS PORTÉES SIMULTANÉMENT

OPTION B.1: plusieurs portées l'une après l'autre

1. Anesthésie locale + analgésie de tous les porcelets mâles de plusieurs portées à la suite
2. Gardez les porcelets mâles séparés
3. Retournez à la première portée
4. Effectuez les autres routines et terminer par la castration
5. Passez maintenant aux autres portées dans l'ordre d'étourdissement

OPTION B.2: plusieurs portées en alternance

1. Anesthésie locale + analgésie de tous les porcelets mâles de 3 portées successives
2. Gardez les porcelets mâles séparés
3. Retournez à la première portée
4. Effectuez les autres routines et terminer par la castration sur la première portée
5. Anesthésie locale + analgésie des porcelets mâles de la 4e portée
6. Effectuer les autres routines et terminer par la castration de la 2ème portée
7. Anesthésie locale + analgésie des porcelets mâles de la 5ème portée
8. ...

C. ROUTINES SUIVIES PAR LA CASTRATION

1. Anesthésie locale et analgésie de tous les porcelets mâles
2. Les porcelets mâles de chaque case de mise bas sont gardés séparément jusqu'à ce que vous reveniez pour les castrer.
3. Les autres routines sont appliquées à toutes les portées.
4. Retournez dans le premier box de mise bas et procédez à la castration.
5. Prélever successivement ensuite tous les mâles dans l'ordre dans lequel vous les avez anesthésiés localement.
6. Vous effectuez la castration par portée.

D. ANESTHÉSIE LOCALE AVANT LES ROUTINES

1. Tous les porcelets de chaque box de mise bas sont rassemblés
2. Portée après portée, tous les porcelets mâles bénéficient d'une anesthésie locale + analgésie
3. Vous retournez dans le premier box de mise bas et effectuez toutes les routines, en terminant par la castration.
4. Vous descendez ensuite tous les mâles dans l'ordre dans lequel vous les avez anesthésiés.
5. Pour chaque portée: vous effectuez les routines, en terminant par la castration

E. SITUATION DES ÉLEVAGES DE TRUIES ALLAITANTES EN PLEIN AIR

1. Les truies en plein air sont libres de leurs mouvements et déplacements : les interventions sur leurs porcelets soient réalisées en une seule fois afin de ne pas trop perturber les mères
2. L'opérateur réalise les castrations près ou dans l'abri de la mère ou bien emporte les porcelets à l'extérieur des parcs pour les castrer à distance de leur mère
3. L'enchaînement des étapes analgésie/anesthésie, puis de castration des mâles est alors réalisé portée par portée
4. Isoler les porcelets mâles de la portée dans une caisse
5. Prendre un à un chaque porcelet, le numéroter avant de lui administrer l'analgésie et l'anesthésique locale puis le reposer dans la caisse
6. Reprendre ensuite les porcelets dans le même ordre pour procéder à la castration, en respectant un temps d'attente minimum de 5 minutes entre l'injection de l'anesthésique locale et la castration