

## Materiaal

### 1. GOEDE FIXATIE VAN DE BIGGEN:

= noodzakelijk voor het toedienen van het verdovend middel.

**Met de hand** of met behulp van een specifiek fixatiemiddel zoals een "**castratieapparaat**".

(Voordeel "castratieapparaat": de bediener kan nauwkeuriger, op de juiste hoogte én met een rechte rug werken.)

### 2. NAALDEN:

- a. Pijnstiller: **in de spieren – 21 G (0,8x9mm)**  
(metaaldetecteerbaar)
- b. Lokale verdoving: **in de teelbal – 25 G (0,5x16mm)<sup>1</sup>**  
(niet-metaaldetecteerbaar)

### 3. SPUITEN:

Gebruik **spuiten** die **aangepast** zijn aan de te injecteren volumes om de noodzakelijke **hoeveelheid product nauwkeurig toe te dienen**.

- klein volume: bv. **dosis 0,5 cc = injector van 0,5 - 1 cc**
- schaalverdeling: **0,1 ml**

### 4. MESSEN:

Werk steeds met **scherpe messen!**

- **1 mes/toom<sup>2</sup>**
- **Wissel tussen twee mesjes** zodat één telkens in **ontsmettingsmiddel** zit
- Bewaar **gebruikte mesjes** in een **afgesloten container**

### 5. HANDSCHOENEN:

**Vermijd huidcontact!** Gebruik bij voorkeur **chirurgische** handschoenen (nitril)

### 6. VERZAMELBAK:

- **Hoog** genoeg (minstens 40 cm)
- **Groot** genoeg (alle biggen naast elkaar)
- **Proper en droog**

<sup>1</sup> Voorkeur, zoniet 21G.

<sup>2</sup> Max. 1 mes/2 tomen.

